

# Kronik Lenfositik Lösemi


## NCI 96-IWCLL 2008 güncellemesine göre aktif hastalık kriterleri

- Anemi ve/veya trombositopeninin ortaya çıkması ya da derinleşmesi gibi ilerleyici kemik iliği yetersizliği bulguları
- Masif (sol kosta kenarını 6 cm geçen) ya da ilerleyici veya semptomatik splenomegali
- Masif (uzun çapı en az 10 cm) veya ilerleyici ya da semptomatik lenfadenopati
- Progresif lenfositoz: Mutlak lenfosit sayısının 2 aydan kısa sürede %50' den fazla artması ya da lenfosit sayısının iki katına çıkma süresinin (LDT) 6 aydan kısa olması. Tanı anındaki lenfosit sayısı  $\text{mm}^3$ 'te 30.000'in altında olan hastalarda LDT tek başına tedaviye başlamak için bir kriter olarak kullanılmamalıdır.
- Kortikosteroid ya da diğer standart tedavilere yanıt alınamayan otoimmün anemi ya da trombositopeniler
- Aşağıdaki bir ya da daha fazla sayıdaki ve hastalıkla ilişkili konstitüsyonel semptomların varlığı
  - Son 6 ay içinde vücut ağırlığının %10'undan fazla istemsiz kilo yitimi
  - Şiddetli halsizlik (Örn. ECOG 2 ya da daha fazla, günlük aktiviteleri yerine getirememe ya da çalışmama)
  - İnfeksiyon belirtileri olmaksızın 2 haftadan uzun süren ve 38 C'den yüksek ateş
  - İnfeksiyon bulguları olmaksızın 1 aydan uzun süren gece terlemeleri

# **Kronik Lenfositik Lösemi**

## **Tedavi Endikasyonları**


- **Aktif hastalığı olmayan düşük riskli hastalarda (Rai 0 / Binet A) tedavisiz izlem**
- **Aktif hastalığı olmayan orta riskli hastaların (Rai I-II / Binet B) bir kısmında hastalar tedavisiz izlenebilir**
- **Tedavi Endikasyonları**
  - **Düşük riskli (Rai 0 / Binet A) ve aktif hastalığı olanlar**
  - **Orta riskli (Rai I-II / Binet B) ve aktif hastalığı olanlar**
  - **Yüksek riskli (Rai III-IV / Binet C) hastalar**



\* Geri ödemesi yoktur  
@Türkiye'de bulunmuyor

# İkinci sıra tedavi

(İmmünokemoterapi uygulananlarda 24, uygulanmayanlarda 12 aydan önceki nüksler “erken nüks” olarak kabul edilmektedir)



\* Geri ödemesi yoktur  
@Türkiye’de bulunmuyor